

**MAIER**  
Typo & Litho

Rheinstraße 44 · 76185 Karlsruhe  
Fon 0721/952610 · Fax 9526199  
info@maier-ll.de · www.maier-ll.de

DNU

Dentokind Tabl

RU GI

297 013 62-3

Ident-Nr. neu

297 013 62-2

Ident-Nr. alt

210x148 mm 2-seitig  
Format

schwarz

Farben

PDM 2091/3/AW 2745

PDM-Akte

Pragmatica

Schriftarten

10,25 Pt

Kleinste Schriftgröße

InDesign CC

Programm

13.12.2022

Änderung

Korrektur

Digitale Freigabe

Datenpool



## ИНСТРУКЦИЯ по медицинскому применению препарата

# ДЕНТОКИНД /

Dentokind®

Регистрационный номер ЛСР-009040/10 от 31.08.2010

Торговое название препарата  
ДЕНТОКИНД

Лекарственная форма  
таблетки для рассасывания

Состав (на 1 таблетку):

*активные компоненты:* Belladonna (белладонна) D6 15 мг, Chamomilla recutita (chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) D6 15 мг, Ferrum phosphoricum (феррум фосфорикум) D6 15 мг, Hepar sulfuris (гепар сульфурис) D12 15 мг, Pulsatilla pratensis (пульсатилла пратенсис) D6 15 мг;  
*вспомогательные компоненты:* целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат.

Описание

Таблетки белого цвета плоскоцилиндрической формы, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Лечение болезненных симптомов при прорезывании молочных зубов у детей, таких как: болезненная чувствительность, припухлость и воспаление десен; беспокойство и раздражительность; лихорадка; оталгия, диарея.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам состава препарата; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Дентокинд следует принимать следующим образом:

Дети до 3 лет:

при острых симптомах по 1 таблетке через каждый час, но не более 6 таблеток в сутки; после ослабления симптомов – по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети от 3 до 6 лет:

при острых симптомах по 2 таблетки через каждый час, но не более 12 таблеток в сутки; после ослабления симптомов – по 2 таблетки 3 раза в день.

Таблетки принимают внутрь за 30 минут до еды или через 40 минут после еды, медленно рассасывая их в полости рта. При лечении грудных детей и детей до 3 лет таблетки необходимо растворить в небольшом количестве воды (1 чайная ложка). Длительность лечения – до 7 дней. При необходимости возможно применение повторного курса.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. До настоящего времени информация о случаях возникновения побочных эффектов не поступала. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.



**MAIER**  
Typo&Litho

Rheinstraße 44 · 76185 Karlsruhe  
Fon 0721/952610 · Fax 9526199  
info@maier-tl.de · www.maier-tl.de

**DHU**

**Dentokind Tabl**

**RU** **GI**

297 013 62-3

Ident-Nr. neu

297 013 62-2

Ident-Nr. alt

210x148 mm 2-seitig  
Format

schwarz

Farben

PDM 2091/3/AW 2745

PDM-Akte

Pragmatica

Schriftarten

10,25 Pt

Kleinste Schriftgröße

InDesign CC

Programm

13.12.2022

Änderung

Korrektur

Digitale Freigabe

Datenpool



**Передозировка**

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

**Взаимодействия с другими лекарственными препаратами**

Не известны.

Если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства, в том числе и те, которые можно приобрести без рецепта, то сообщите об этом Вашему врачу.

**Особые указания**

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При отсутствии улучшения состояния ребенка на фоне применения препарата в течение первых 2-х суток и/или повышении температуры тела выше 38 °C необходимо обратиться к врачу.

Максимальная суточная доза при острых симптомах составляет 12 таблеток, что соответствует 0,1 хлебной единицы (ХЕ).

**Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания. По 150 таблеток во флаконе из коричневого стекла с пластмассовой крышкой, с контролем первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения**

При температуре от 15 °C до 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет.

Не применять по истечении срока годности препарата.

**Условия отпуска из аптек**

По рецепту.

**Производитель**

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:

Альпен Фарма ГмбХ

Германия, 77736 Целль ам Хармерсбах, Штайненфельд 3

Производитель (все стадии):

Дойче Хомеопати-Унион

ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ,

Оттоштрассе, 24

**Представительство в РФ /**

**Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «Альпен Фарма», эксклюзивный представитель в России, 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.10, 3 этаж, каб.2

+7 (495) 609-65-72;

эл. почта: info.russia@alpenpharma.com;

интернет-сайт: www.alpenpharma.ru



297 013 62-3 · C. 398 · 2091/3/2745