

MAIER Typo & Litho	
Rheinstraße 44 · 76185 Karlsruhe Fon 0721/952610 · Fax 9526199 info@maier-ll.de · www.maier-ll.de	
DNU	
Dormikind Tabl	GI
RU	
297 018 53-3 Ident-Nr. neu	
297 018 53-2 Ident-Nr. alt	
210x148 mm	2-seitig
Format	
schwarz	
Farben	
PDM 2411/5/AW 2801	
PDM-Akte	
Pragmatica	
Schriftarten	
10,25 Pt	
Kleinste Schriftgröße	
InDesign CC	
Programm	
01.02.2023	
Änderung	
Korrektur	
Digitale Freigabe	
Datenpool	



ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

ДОРМИКИНД

Регистрационный номер ЛП-001605

Торговое наименование препарата Дормикинд

Международное непатентованное или группировочное наименование ~

Лекарственная форма таблетки для рассасывания гомеопатические для детей.

Состав

В одной таблетке содержится:

действующие вещества: *Cypripedium parviflorum var. pubescens* (*Cypripedium pubescens*) D4 15,00 мг, *Magnesium carbonicum* D10 20,00 мг, *Zincum valerianicum* D12 15,00 мг.

вспомогательные вещества: лактозы моногидрат - 29,85 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 15,00 мг, тальк - 5,00 мг, магния стеарат - 0,15 мг.

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы белого или почти белого цвета с фаской.

Фармакотерапевтическая группа: гомеопатическое средство.

Фармакологическое действие

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Применяется для лечения беспокойства и нарушений сна (трудности засыпания, беспокойный сон) у детей до 6 лет.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

С осторожностью

Пациенты с сахарным диабетом.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Не применимо. Данное лекарственное средство предназначено для применения у детей.

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Дормикинд следует принимать следующим образом: *дети от 0 до 6 лет:* по 1 таблетке 4 раза в день.

Таблетки принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая в полости рта. При лечении грудных детей и детей раннего возраста таблетки можно растворять в 5 мл (1 чайная ложка) воды. Максимальный курс лечения препаратом составляет 4 недели.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции и реакции индивидуальной непереносимости. При появлении побочных эффектов, неопи-санных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.



MAIER Typo & Litho	
Rheinstraße 44 · 76185 Karlsruhe Fon 0721/952610 · Fax 9526199 info@maier-ll.de · www.maier-ll.de	
DNU	
Dormikind Tabl	GI
RU	
297 018 53-3	
Ident-Nr. neu	
297 018 53-2	
Ident-Nr. alt	
210x148 mm	2-seitig
Format	
schwarz	
Farben	
PDM 2411/5/AW 2801	
PDM-Akte	
Pragmatica	
Schriftarten	
10,25 Pt	
Kleinste Schriftgröße	
InDesign CC	
Programm	
01.02.2023	
Änderung	
Korrektur	
Digitale Freigabe	
Datenpool	



Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не известны.

Если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие медикаменты, в том числе и те, которые можно приобрести без рецепта, то сообщите об этом Вашему врачу. Не следует принимать препарат вместе с пищей и напитками. Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Препарат применяют по назначению врача. Не давайте ребенку двойную дозу, если был пропущен прием препарата или было принято недостаточное его количество.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата (4 таблетки) соответствует 0,026 хлебной единицы (ХЕ).

При отсутствии улучшения на фоне применения препарата в течение 14 дней или при появлении нежелательных явлений следует проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Не применимо. Данное лекарственное средство предназначено для применения у детей.

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические для детей. По 150 таблеток во флакон коричневого стекла с пластмассовой крышкой, с контролем первого вскрытия. 1 флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет. Не применять препарат после истечения срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:

Альпен Фарма ГмбХ

Германия, 77736 Целль ам Хармерсбах, Штайненфельд 3

Производитель (все стадии):

Дойче Хомеопати-Унион

ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ,

Оттоштрассе, 24

Представительство в РФ / Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Альпен Фарма», эксклюзивный представитель в России, 105082, Москва, ул. Фридриха Энгельса, д.75, стр.10, 3 этаж, каб.2; тел. +7 (495) 609-65-72; эл. почта: info.russia@alpenpharma.com; интернет-сайт: www.alpenpharma.ru

