



**ИНСТРУКЦИЯ**  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

## ЦИННАБСИН

Регистрационный номер: П N013317/01

Торговое наименование препарата: Циннабсин

Международное непатентованное или группировочное наименование ~  
Лекарственная форма: таблетки для рассасывания гомеопатические

### Состав:

В одной таблетке содержится:

**активные компоненты:** Cinnabaris (Циннабарис) D3 - 25,0 мг, Hydrastis (Гидрастис) D3 - 25,0 мг, Kalium bichromicum (Калиум бихромикум) D3 - 25,0 мг, Echinacea (Эхинацея) D1 - 25,0 мг;

**вспомогательные вещества:** лактозы моногидрат - 140,0 мг, крахмал пшеничный – 8,5 мг, магния стеарат - 1,5 мг.

### Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы белого или почти белого цвета с фаской. Допускается наличие отдельных вкраплений.

**Фармакотерапевтическая группа:** гомеопатическое средство.

### Фармакологическое действие

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

### Показания к применению

Применяется для лечения острых и хронических синуситов (воспаление придаточных пазух носа: гайморита, фронтита и т.д.) в комплексной терапии.

### Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата, а также к растениям семейства сложноцветных; непереносимость крахмала, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Детский возраст до 3 лет по причине недостаточности соответствующих клинических данных.

### С осторожностью

Пациенты с сахарным диабетом.

### Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Во время беременности и в период кормления грудью принимать препарат только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка). Необходимо проконсультироваться с врачом.

### Способ применения и дозы

Таблетки принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая в полости рта.

*При остром заболевании детям от 3 до 6 лет* следует принимать по 1 таблетке каждые 2 часа (не более 6 раз в день) до наступления улучшения. При дальнейшем лечении по 1/2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления.

*Детям с 6 до 12 лет* следует принимать по 1 таблетке каждый час (не более 7-8 раз в день) до наступления улучшения. При дальнейшем лечении по 1 таблетке 2 раза в день до полного выздоровления.

*Детям старше 12 лет и взрослым* принимать при остром заболевании по 1 таблетке каждый час (не более 12 раз в день) до наступления улучшения, далее по 1-2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления.

*При хроническом течении заболевания* детям старше 12 лет и взрослым принимать по 1 таблетке 3 раза в день до улучшения состояния. *Детям от 3 до 6 лет* следует принимать по 1/2 таблетки 3 раза в день, *детям от 6 до 12 лет* – по 1 таблетке 2 раза в день.

Курс лечения для предотвращения рецидивов при хроническом течении заболевания рекомендуется до 2 месяцев.

В случае отсутствия улучшения или ухудшении состояния *при остром заболевании* по истечении 3 дней лечения Циннабсином, препарат следует отменить и обратиться к врачу.

### Побочное действие

Возможны аллергические реакции и реакции индивидуальной непереносимости. При кожных реакциях, которые возможны в единичных случаях, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

**MAIER**  
Typo & Litho

Rheinstraße 44 · 76185 Karlsruhe  
Fon 0721/95 2610 · Fax 95 26199  
info@maier-ll.de · www.maier-ll.de

DNU

Cinnabsin Tabl.

RU

GI

242 316 41-0

Ident-Nr. neu

242 316 40-9

Ident-Nr. alt

250x148 mm 2-seitig

Format

schwarz

Farben

PDM 2132/4/AW 2052

PDM-Akte

InDesign CC

Programm

Pragmatica

Schriften

9,5 pt.

Schriftgröße

03.03.2021

Änderung

Korrektur

Digitale Freigabe

Datenpool



**MAIER**  
Typo & Litho

Rheinstraße 44 · 76185 Karlsruhe  
Fon 0721/95 2610 · Fax 95 26199  
info@maier-ll.de · www.maier-ll.de

DNU

Cinnabsin Tabl.

RU GI

242 316 41-0

Ident-Nr. neu

242 316 40-9

Ident-Nr. alt

250x148 mm 2-seitig  
Format

schwarz

Farben

PDM 2132/4/AW 2052

PDM-Akte

InDesign CC

Programm

Pragmatica

Schriften

9,5 pt.

Schriftgröße

03.03.2021

Änderung

Korrektur

Digitale Freigabe

Datenpool



После применения может наблюдаться повышенное слюноотделение. В этом случае следует снизить дозировку или прекратить прием препарата. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

#### Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

#### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано. Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

Если Вы или Ваш ребенок принимаете или принимали другие лекарственные препараты, (в том числе безрецептурные), сообщите об этом лечащему врачу.

#### Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. Препарат можно применять пациентам с целиакией. Пациентам с непереносимостью крахмала (заболеванием, отличным от целиакии) не следует принимать препарат, так как в нем содержится пшеничный крахмал.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата (12 таблеток) соответствует 0,25 хлебной единицы (XE).

Не следует принимать препарат вместе с пищей и напитками.

#### Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

#### Форма выпуска

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 20 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и пленки ПВХ. По 5 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

#### Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### Срок годности

4 года. Не применять препарат после истечения срока годности.

#### Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

#### Производитель

Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе, 24

Производитель:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ, Вильмар Швабе штрассе, 4

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе, 24

Фасовщик (первичная упаковка)

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ, Вильмар Швабе штрассе, 4

Упаковщик (вторичная упаковка)

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ, Вильмар Швабе штрассе, 4

Выпускающий контроль качества

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе, 24

#### Представительство в РФ / Организация, принимающая претензии потребителей:

ООО «Альпен Фарма», эксклюзивный представитель в России, 117513, Москва, ул.

Островитянова, д. 6; тел. +7(495) 609-65-72; эл. почта: info.russia@alpenpharma.com;

интернет-сайт: www.alpenpharma.ru

