

## ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

# КЛИМАКТОПЛАН Н

Регистрационный номер: ЛС-002009

Торговое наименование препарата: Климактоплан Н

Международное непатентованное или группировочное наименование ~

Лекарственная форма: таблетки для рассасывания гомеопатические

### Состав:

В одной таблетке содержится:

**активные компоненты:** Cimicifuga racemosa (Cimicifuga) (цимицифуга рацемоза) (цимицифуга) D2 - 25,0 мг, Sepia officinalis (Sepia) (сепия официналис) (сепия) D2 - 25,0 мг, Strychnos ignatii (Ignatia) (стрихнос игнатии) (игнатия) D3 - 25,0 мг, Sanguinaria canadensis (Sanguinaria) (сангвинария канаденсис) (сангвинария) D6 - 25,0 мг; **вспомогательные вещества:** лактозы моногидрат - 123,75 мг, крахмал пшеничный – 22,50 мг, магния стеарат - 3,75 мг.

### Описание

Плоскоцилиндрической формы таблетки от светло-серого до серого цвета, с фаской. Допускается наличие вкраплений.

**Фармакотерапевтическая группа:** гомеопатическое средство.

### Фармакологическое действие

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

### Показания к применению

Климактерический синдром, сопровождающийся приливами жара, усиленным потоотделением, сердцебиением, головокружением, зудом, нервным напряжением, нарушением сна.

### Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата; непереносимость крахмала, дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция, возраст до 18 лет.

### С осторожностью

Пациенты с сахарным диабетом.

### Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Препарат не предназначен для применения при беременности и в период грудного вскармливания.

### Способ применения и дозы

Внутрь. По 1-2 таблетки 3 раза в день, принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая в полости рта. Длительность лечения препаратом определяется врачом и составляет 3-4 месяца. Повторные курсы возможны после согласования с врачом.

### Побочное действие

Возможны следующие побочные эффекты: аллергические реакции и реакции индивидуальной непереносимости, головокружение, желудочно-кишечные расстройства, металлический привкус во рту, менструальные кровотечения, носовое кровотечение. При появлении побочных эффектов, не описанных в данной инструкции, следует прекратить прием препарата и сообщить об этом лечащему врачу.

### Передозировка

До настоящего времени случаи передозировки не зарегистрированы.

### Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат не рекомендуется принимать одновременно с другими препаратами цимицифуги во избежание усиления побочных эффектов последних.

Прием гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

**Особые указания**

При применении гомеопатических лекарственных средств могут временно обостряться имеющиеся симптомы (первичное ухудшение). В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом. В случае диагностирования беременности при применении препарата в период беременности прием препарата следует прекратить. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 3-х месяцев или необходимости повторения курса рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Информация для пациентов с сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата (6 таблеток) соответствует 0,13 хлебной единицы (ХЕ).

Препарат можно применять пациентам с целиакией. Пациентам с непереносимостью крахмала (заболеванием, отличным от целиакии) не следует принимать препарат, так как в нем содержится пшеничный крахмал.

**Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Так как при приеме препарата возможно появление головокружения, в период лечения необходимо соблюдать осторожность при выполнении потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

**Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания гомеопатические. По 20 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и пленки ПВХ. По 5 блистеров вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

**Условия хранения**

При температуре от 15 до 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

5 лет. Не применять препарат после истечения срока годности.

**Условия отпуска**

Отпускают без рецепта.

**Производитель**

*Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение:*

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе, 24

*Производитель:*

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ, Вильмар Швабе штрассе, 4  
Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе, 24

*Фасовщик (первичная упаковка)*

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ, Вильмар Швабе штрассе, 4

*Упаковщик (вторичная упаковка)*

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ, Вильмар Швабе штрассе, 4

*Выпускающий контроль качества*

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ  
Германия, 76227 Карлсруэ, Оттоштрассе, 24

**Представительство в РФ / Организация, принимающая претензии потребителей:**

ООО «Альпен Фарма», эксклюзивный представитель в России,  
117513, Москва, ул. Островитянова, д. 6; тел. +7(495) 609-65-72; эл.  
почта: info.russia@alpenpharma.com; интернет-сайт: www.alpenpharma.ru