

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ДЕНТОКИНД / Dentokind®

Регистрационный номер

Торговое название препарата
ДЕНТОКИНД

Лекарственная форма
таблетки для рассасывания

Состав (на 1 таблетку):

активные компоненты: Belladonna (белладонна) D6 15 мг, Chamomilla recutita (chamomilla) (хамомилла рекутита (хамомилла)) D6 15 мг, Ferrum phosphoricum (феррум фосфорикум) D6 15 мг, Hepar sulfuris (гепар сульфурис) D12 15 мг, Pulsatilla pratensis (пульсатилла пратенсис) D6 15 мг;

вспомогательные компоненты: целлюлоза микрокристаллическая, лактозы моногидрат, тальк, магния стеарат.

Описание

Таблетки белого цвета плоскоцилиндрической формы, с фаской.

Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатическое средство

Фармакологическое действие

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Лечение болезненных симптомов при прорезывании молочных зубов у детей, таких как: болезненная чувствительность, припухлость и воспаление десен; беспокойство и раздражительность; лихорадка; оталгия, диарея.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам состава препарата; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Способ применения и дозы

При отсутствии иных указаний Дентокинд следует принимать следующим образом:

Дети до 3 лет:

при острых симптомах по 1 таблетке через каждый час, но не более 6 таблеток в сутки; после ослабления симптомов – по 1 таблетке 3 раза в день.

Дети от 3 до 6 лет:

при острых симптомах по 2 таблетки через каждый час, но не более 12 таблеток в сутки; после ослабления симптомов - по 2 таблетки 3 раза в день.

Таблетки принимают внутрь за 30 минут до еды или через 40 минут после еды, медленно рассасывая их в полости рта. При лечении грудных детей таблетки необходимо растворить в небольшом количестве воды (1 чайная ложка).

Длительность лечения – до 7 дней. При необходимости возможно применение повторного курса.

Побочные действия

Возможны аллергические реакции. До настоящего времени информация о случаях возникновения побочных эффектов не поступала. При возникновении побочных эффектов следует обратиться к врачу.

Передозировка

Случаи передозировки до настоящего времени не были зарегистрированы.

Взаимодействия с другими лекарственными препаратами

Не известны.

Если Ваш ребенок принимает или принимал в недавнем прошлом другие лекарственные средства, в том числе и те, которые можно приобрести без рецепта, то сообщите об этом Вашему врачу.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

При отсутствии улучшения состояния ребенка на фоне применения препарата в течение первых 2-х суток и/или повышении температуры тела выше 38°C необходимо обратиться к врачу.

Максимальная суточная доза при острых симптомах составляет 12 таблеток, что соответствует 0,1 хлебной единицы (ХЕ).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания. По 150 таблеток во флаконе из коричневого стекла с пластмассовой крышкой, с контролем первого вскрытия. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

Хранить при температуре от 15 °С до 25 °С, в сухом месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять по истечении срока годности препарата.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие-производитель

Дойче Хомеопати-Унион
 ДХУ-Арцнайmittel GmbH & Co. KG
 Германия, 76227 Карлсруэ,
 Оттоштрассе, 24
 Тел.: +49 / 721 / 40 93 236

Deutsche Homöopathie-Union
 DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
 Germany, 76227 Karlsruhe,
 Ottostrasse, 24
 tel. +49 / 721 / 40 93 236

Представительство в России /**Организация, принимающая претензии потребителя**

117513 г.Москва, ул. Островитянова, д.6
 Тел. (495) 225-71-21

Нач.отдела регистрации ЛС
 Представительства «Дойче Хомеопати-Унион»
 ДХУ – Арцнайmittel GmbH & Co. KG»



Е.В. Назарова

