

**ИНСТРУКЦИЯ**  
**по медицинскому применению препарата**

**ИНФЛЮЦИД / Influid®**

**Регистрационный номер**

**Торговое название препарата**

ИНФЛЮЦИД

**Лекарственная форма**

таблетки для рассасывания

**Состав (на 1 таблетку)**

*активные компоненты:* Aconitum napellus (Aconitum) (аконитум напеллус (аконитум)) D3 - 25 мг, Gelsemium sempervirens (Gelsemium) (Гельземиум семпервиренс (гельземиум)) D3 - 25 мг, Cerphaelis ipecacuanha (Ipecacuanha) (цефалис ипеакауана (ипеакауана)) D3 - 25 мг, Phosphorus (фосфорус) D5 - 25 мг, Bryonia (бриония) D2 - 25 мг, Eupatorium perfoliatum (эупаториум перфолиатум) D1 - 25 мг;

*вспомогательные компоненты:* лактозы моногидрат, пшеничный крахмал, магния стеарат.

**Описание**

Таблетки плоскоцилиндрической формы, белого цвета с легким желтоватым оттенком, с фаской, иногда с отдельными темными вкраплениями.

**Фармакотерапевтическая группа**

Гомеопатическое средство

**Фармакологическое действие**

Комплексный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено компонентами, входящими в его состав.

**Показания к применению**

Применяется для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций.

**Противопоказания**

Повышенная индивидуальная чувствительность к отдельным компонентам препарата; непереносимость крахмала; дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

Детский возраст до 3 лет по причине недостаточности клинических данных.

**Применение при беременности и в период лактации**

Во время беременности и в период лактации принимать препарат только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка).

**Способ применения и дозы**

Таблетки принимают за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая их в полости рта.

Детям до 5 лет рекомендуется для удобства применения растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде, под язык.

*При остром заболевании:*

*Детям от 3 до 6 лет* следует принимать по 1 таблетке каждые 2 часа (не более 6 раз в день) до наступления улучшения, при дальнейшем лечении по 1/2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления.

*Детям от 6 до 12 лет* следует принимать по 1 таблетке каждый час (не более 7-8 раз в день) до наступления улучшения, при дальнейшем лечении по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.

*Детям старше 12 лет и взрослым* принимать по 1 таблетке каждый час (не более 12 раз в день) до наступления улучшения, далее по 1-2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления.

*Для профилактики респираторно-вирусной инфекции:*

*Детям от 3 до 6 лет* следует принимать по 1/2 таблетки 2 раза в день.

*Детям от 6 до 12 лет* – по 1 таблетке 2 раза в день.

*Детям старше 12 лет и взрослым* следует принимать по 1 таблетке 3 раза в день.

Профилактическое применение проводят в течение всего времени, пока в окружении находятся люди с симптомами респираторно-вирусной инфекции.

В случае отсутствия улучшения *при остром заболевании* по истечении 2 дней лечения Инфлюцидом, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.

**Побочные действия**

Возможны аллергические реакции.

**Взаимодействие с другими лекарственными препаратами**

Приём гомеопатических препаратов не исключает лечение другими лекарственными средствами.

**Особые указания**

При применении гомеопатических лекарственных средств возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Препарат можно применять больным с целиакией.

Пациентам с непереносимостью крахмала (заболеванием, отличным от целиакии) не следует принимать Инфлюцид, поскольку в нем содержится пшеничный крахмал.

Таким пациентам рекомендуется применение препарата в форме капель.

Пациентам, страдающим сахарным диабетом, необходимо учитывать, что максимальная суточная доза при острых состояниях составляет 12 таблеток, что соответствует 0,25 хлебной единицы (ХЕ).

#### **Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания. По 20 таблеток в блистер из алюминиевой фольги и пленки ПВХ. По 3 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

#### **Условия хранения**

При температуре от 15 до 25 °С, в сухом месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

#### **Срок годности**

3 года.

Не применять по истечении срока годности препарата.

#### **Условия отпуска из аптек**

Без рецепта.

#### **Предприятие-производитель**

Дойче Хомеопати-Унион ДХУ-  
Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ,

Оттоштрассе, 24

тел. +49 / 721 / 40 93 236

Произведено:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ,

Вильмар Швабе Штрассе, 4,

Карлсруэ, 76227 Германия

Deutsche Homöopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Germany, Karlsruhe 76227

Ottostrasse, 24

tel. +49 / 721 / 40 93 236

#### **Представительство в России / Организация, принимающая претензии потребителей**

117513 Москва, ул.Островитянова, д.6

тел.: (495) 225-71-21

Начальник отдела регистрации ЛС

«Дойче Хомеопати-Унион

ДХУ – Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.»



Е.В. Назарова



4 2 5 4 1