

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ИРИКАР**Регистрационный номер:****Торговое наименование препарата:** Ирикар**Лекарственная форма**

мазь для наружного применения.

Состав (на 100 г мази):активный компонент: *Cardiospermum halicacabum* (*Cardiospermum*)
(кардиоспермум халикакабум (кардиоспермум)) Ø – 10,0 г.

вспомогательные компоненты: ланолиново-спиртовая мазь* – 35,0 г; ланолин – 15,0 г; парафин жидкий – 12,5 г; вода очищенная – 27,5 г.

* цетостеариловый спирт : ланолиновый спирт : парафин мягкий белый в соотношении 0,5 : 6,0 : 93,5. До 12 частей парафина мягкого белого может быть заменено парафином жидким.

Описание

Однородная мазь светло-желтого цвета без особого запаха. У содержащейся в тубах мази может наблюдаться незначительное выделение масла светло-желтого цвета в области отверстия тубы. Это легкое выделение масла не является признаком нестабильности и безопасно.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Фармакологическое действие

Монокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено активным компонентом, входящим в его состав.

Показания к применению

Комплексная терапия кожных заболеваний, сопровождающихся зудом: нейродермита, атопического дерматита, экземы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст до 1 года.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Во время беременности и в период грудного вскармливания применять препарат только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода (ребенка). Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Взрослым и детям старше 1 года наносить мазь на пораженные участки кожи тонким слоем, слегка втирая, 3 раза в день. При отсутствии терапевтического эффекта в течение 14 дней необходимо обратиться к врачу.

Побочное действие

В редких случаях возможны аллергические реакции со стороны кожных покровов.

Передозировка

В настоящее время случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

До настоящего времени неизвестны.

Применение гомеопатических препаратов не исключает применение других лекарственных средств.

Особые указания

При применении гомеопатических лекарств возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

Влияние на способность управлять транспортными средствами и механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора и т.п.).

Форма выпуска

Мазь для наружного применения.

По 50 г препарата в алюминиевой тубе с внутренним двойным защитным покрытием из лака на феноло-эпоксидной смоле и внешним покрытием с завинчивающейся пластмассовой крышкой. Туба вместе с инструкцией по медицинскому применению помещается в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре не ниже 0 °С и не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

После вскрытия тубы хранить не более 6 месяцев.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

Дойче Хомеопати-Унион

ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ

Германия, 76227 Карлсруэ,

Оттоштрассе 24

Тел. +49 / 721 / 40 93 236

Произведено:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ, Германия.

Представительство в РФ / Организация, принимающая претензии потребителей

ООО «Альпен Фарма», 117513, Москва, ул. Островитянова, д. 6;

тел. +7 (495) 609-65-72; эл. почта: info.russia@alpenpharma.com; интернет-

сайт: www.alpenpharma.ru

Генеральный директор ООО «Альпен Фарма»

Зудин В.Б.

